AVERTISSEMENTS AGRICOLES

AUVERGNE ET LIMOUSIN

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Cité Administrative, rue Pélissier 63034 Clermont Ferrand Cedex

(73) 92-42-68

BULLETIN TECHNIQUE PUBLICATION PERIODIQUE

Edition générale

Le 24 Février 1983

N.3

ARBRES FRUITIERS A PEPINS

CHANCRE A NECTRIA DU POMMIER



Le symptôme le plus caractéristique est la formation de chancres.

Les contaminations peuvent se produire en toute saison par temps de pluie.

En verger infesté, afin de lutter contre cette maladie, il convient :

* de mettre en oeuvre les <u>mesures prophylactiques</u> suivantes :

- taille par temps sec,

- élimination des rameaux porteurs de chancres,

- curetage des gros chancres sur troncs et charpentières.

- ramassage et brûlage des bois atteints et fragments d'écorce enlevés lors du curetage,

- éviter la formation de blessures : outils ...

* de <u>protéger les grosses plaies</u> de taille ou de curetage avec une spécialité commerciale à base d'oxyde de mercure (SANTAR, KANKERTOX 3) ou d'oxyquino-léate de cuivre (QUINOLATE 400).

* d'effectuer, au gonflement des bourgeons (stade B) un traitement à l'aide d'un produit cuprique à la dose de 500 g de cuivre /hl d'eau.

. . . / . . .

ARBRES FRUITIERS A NOYAU

CLOQUE DU PECHER

La période sensible à cette maladie s'échelonne de l'allongement des bourgeons à bois à l'étalement des premières feuilles.

Cette période doit être impérativement couverte par

des traitements fongicides.

Appliquer dans les prochains jours un traitement avec un fongicide de synthèse (voir bulletin n° 2 du 27.01.1983).

Ne plus employer le cuivre, le stade B étant dépassé par la plupart des variétés.

MONILIOSE DU PRUNIER ET DU CERISIER

Il est important d'éliminer par la taille les fruits

Puis afin de limiter les contaminations, un traitement d'eau.

Puis afin de limiter les contaminations, un traitement d'eau.

CORYNEUM DU CERISIER (Maladie criblée)

Le coryneum provoque sur les feuilles l'apparition de petites tâches arrondies qui se dessèchent et tombent donnant aux feuilles un aspect criblé.

La maladie peut également attaquer les jeunes fruits et les rameaux sur lesquels se forment des chancres laissant exsuder de la gomme.

Un traitement au gonflement des bourgeons (stade B) à l'aide d'un produit cuprique à la dose de 500 g de cuivre métal/hl d'eau est conseillé afin de réduire les contaminations.

VIGNE

ACARIOSE



Bourgeon dans le coton

Suit de près le début des pleurs ». Bourgeon gonflé dont les écailles s'écartent; protection cotonneuse brunâtre très visible

Les attaques de ce minuscule acarien (1/10è de mm de long) se traduisent par un rabougrissement de la végétation, les feuilles restent petites et sont frisées et duveteuses.

Les dégâts sont accentués par temps froid au printemps.


Au cours de l'année 1982, cet acarien a été observé dans les différents secteurs viticoles.

Dans les parcelles où les dégâts ont été notés, effectuer un traitement avant le gonflement des bourgeons (stade B).


Utiliser une spécialité commerciale à base d'huiles jaunes à la dose de 2,5 l à 3 l par hl d'eau.

Bien mouiller les bois afin d'atteindre ces acariens sous les écorces et les écailles des bourgeons.

cerisier



pêcher



平231

Le Service de la Protection des Végétaux sera présent au

SALON DE L'AGRICULTURE

qui se tiendra à Paris, Porte de Versailles, du 06 au 13 mars 1983.

Section MINISTERE DE L'AGRICULTURE Bât. 2 2. Allée K. Stand Direction de la Qualité N°333

Une information vous sera présentée sur le thème : "Le Service de la Protection des Végétaux et le développement agricole" :

- L'articulation de nos différentes missions :
 Avertissements Agricoles, Expérimentation, Diagnostic
 en Laboratoires, Contrôles Phytosanitaires.
- Pour une meilleure maîtrise des coûts de production dans la sécurité : des moyens modernes et cohérents.